

¿Sus hijos están preparados?

Ley de vacunación de Minnesota

Requisitos de vacunación

Utilice el siguiente cuadro como guía para determinar qué vacunas son obligatorias para la inscripción en guarderías, programas de la primera infancia y escuelas (públicas o privadas).

Busque el nivel de grado y edad de su hijo y verifique que haya recibido la cantidad de dosis de cada vacuna que se indican con las marcas de verificación. Es posible que los niños menores de 2 años no hayan recibido todas las dosis. Mire la tabla del reverso para saber a qué edad se deben recibir las dosis.

Nacimiento hasta 4 años Programas de la primera infancia y guarderías	Edad: 5 a 6 años ^① Para kindergarten	Edad: 7 a 11 años Para 1.º a 6.º grado	Edad: a partir de los 12 años Para 7.º a 12.º grado
Hepatitis A (Hep A) ✓✓			
Hepatitis B (Hep B) ✓✓✓	Hepatitis B ✓✓✓	Hepatitis B ✓✓✓	Hepatitis B ^⑥ ✓✓✓
DTaP/DT ✓✓✓✓	DTaP ^④ ✓✓✓✓✓	✓✓✓ dosis que contienen tétanos y difteria	Tdap ^⑦ ✓
Poliomielitis ✓✓✓	Poliomielitis ^⑤ ✓✓✓✓	Poliomielitis ✓✓✓	Poliomielitis ✓✓✓
MMR ✓	MMR ✓✓	MMR ✓✓	MMR ✓✓
Hib ✓			Meningococo ^⑧ ✓ y refuerzo
Neumococo ^② ✓✓✓✓			
Varicela ^③ ✓	Varicela ^③ ✓✓	Varicela ^③ ✓✓	Varicela ✓✓

Vacunas recomendadas pero no obligatorias:

Gripe

Cada año para todos los niños mayores de 6 meses

Rotavirus

Para bebés

Virus del papiloma humano

A los 11 o 12 años de edad

- ① Los niños de primer grado que tienen 6 años de edad o menos deben observar el calendario de vacunación de poliomielitis y DTaP/DT para kindergarten.
- ② No es obligatoria después de los 24 meses.
- ③ Si el niño ya tuvo varicela, no es obligatoria esta vacuna. Si la enfermedad tuvo lugar después de 2010, el médico del niño debe firmar un formulario.
- ④ La quinta dosis de DTaP no es necesaria si la cuarta se recibió después de los 4 años de edad. La última dosis de DTaP se recibe a partir de los 4 años de edad.
- ⑤ La cuarta dosis de poliomielitis no es necesaria si la tercera se recibió después de los 4 años de edad. La última dosis de poliomielitis se recibe a partir de los 4 años de edad.
- ⑥ También se puede seguir un calendario alternativo de 2 dosis de hepatitis B para niños de 11 a 15 años de edad.
- ⑦ Se requiere constancia de al menos tres dosis de la vacuna contra el tétanos y la difteria. Si el niño recibió la vacuna contra el tétanos, la difteria y la tos ferina (Tetanus, Diphtheria and Pertussis, Tdap) entre los 7 y los 10 años, no es necesaria otra dosis. La vacuna contra Td no cumple con el requisito de la vacuna contra Tdap.
- ⑧ Se requiere una dosis a partir del 7.º grado. La dosis de refuerzo se administra generalmente a los 16 años, pero depende de cuándo se administró la primera dosis.

Exenciones

Para la inscripción en guarderías, programas de la primera infancia y escuelas de Minnesota, los niños deben demostrar que han recibido estas vacunas o presentar una exención legal.


Los padres pueden presentar una exención médica firmada por un proveedor de atención médica, o una objeción de conciencia notariada firmada por el padre, madre o tutor.

¿Necesita registros?

Para obtener copias de los registros de vacunación de su hijo, hable con su médico o llame al sistema Minnesota Immunization Information Connection (MIIC) al 651-201-5503 o al 1-800-657-3970.

Cuándo vacunarse Desde el nacimiento hasta los 16 años

CC = Guardería (Child care)
ECP = Programas de la primera infancia
(Early Childhood Programs)
K-12 = De kindergarten a 12.º grado
7-12 = De 7.º a 12.º grado



Nunca es tarde! Si su hijo no tiene todas las vacunas al día, hable con su médico o clínica para administrárselas.

La ley de Minnesota exige una constancia por escrito de ciertas vacunas para inscribir a los niños en guarderías, programas de la primera infancia y escuelas. No obstante, si el menor tiene una razón médica o si sus padres se oponen a conciencia a alguna o a todas las vacunas, existe una exención legal.

Los niños con ciertas afecciones médicas pueden necesitar vacunas adicionales
(por ejemplo, contra el neumococo o el meningococo). Consulte a su médico o clínica.

¿Está embarazada? Protéjase a usted y a su bebé de la tos ferina. Vacúnese contra Tdap entre las 27 y 36 semanas de gestación. Consulte a su médico.

*La **cantidad de dosis** depende del producto que usa su médico.

Para obtener copias de los **registros de vacunación** de su hijo, hable con su médico o llame al Minnesota Immunization Information Connection (MIIC) al 651-201-5503 o al 1-800-657-3970.

Significado de las abreviaturas de vacunas

DTaP/Tdap = difteria, pertussis, tétanos	Hib = <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b
Hep B = hepatitis B	Hep A = hepatitis A
MMR = sarampión, paperas, rubéola	IPV = poliomielitis
	PCV = neumococo
	RV = rotavirus